

Fiche pédagogique

Lutter contre les chenilles sur les choux

La piéride du chou est un papillon très commun dont la chenille se nourrit essentiellement de feuilles de chou. Elle peut engendrer de sérieux dégâts au potager du printemps à l'automne.

Comment reconnaître les chenilles ?

La piéride du chou a une envergure de 6 cm, de couleur verte avec des petites taches noires.

La femelle dépose 20 à 50 œufs de couleur jaune-orangé principalement sur le dessous des feuilles.

Les chenilles se dispersent après l'éclosion et dévorent entièrement les feuilles ne laissant que les nervures.



Les gestes de préventions contre l'apparition des piérides du chou :

Vous pouvez planter à proximité des choux des aromatiques comme la menthe, le romarin ou même le thym qui ont la réputation d'éloigner les piérides à la recherche de plantes pour leur ponte.



L'installation d'un filet de protection anti-insectes pour empêcher les papillons de venir pondre sur vos plantes peut également être une solution.

Comment arrêter la propagation des chenilles de choux ?

La méthode la plus naturelle pour éliminer les chenilles du chou reste celle de les ramasser à la main.

Munissez-vous de gants robustes et d'un récipient pour y déposer les chenilles récoltées.

Selon vos convictions, relâchez-les dans les hautes herbes loin du potager ou écrasez-les.

Il est important de rester vigilant et de procéder à une récolte quotidienne des chenilles en cas d'attaque intense sur vos choux.

Ptipot[®]

